Критерии «Низкий риск / высокий риск»[1]

(«Лихорадка у детей младше 5 лет: оценка состояния и начальное ведение» (National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Fever in under 5s: assessment and initial management. NICE Guideline NG143 (NICE NG143)).

Признак	Низкий риск	Высокий риск
Цвет кожи	Нормальный	Бледность/мраморность/цианоз губ, языка
Активность	Улыбается, реагирует на контакт, быстро просыпается	Не реагирует на социальные стимулы, сонливость, монотонный/слабый или пронзительный плач
Дыхание	Без особенностей	Раздувание крыльев носа, тахипноэ, стонущее дыхание, втяжение межрёберных промежутков, SpO_2 ≤95%
Гидратация	Влажные слизистые, нормальный тургор	Сухие слизистые, снижение диуреза, замедленное наполнение капилляров ≥3 сек
Прочее	Нет «красных флагов» (опасных признаков)	Возраст <3 мес и температура ≥38 °C; возраст 3–6 мес и температура ≥39 °C; лихорадка ≥5 дней; ригидность затылочных мышц, геморрагическая сыпь, судороги, выбухающий родничок

Источники:

1. Пол СП, Кини ПК, Тибревал СР, Хитон ПА. Обзор руководства NICE: лихорадка у детей младше 5 лет: оценка состояния и начальное ведение (NG143). Архив болезней детского возраста. Практическое образование. – 2022. – Июнь;107(3). – 212-216 [Paul SP, Kini PK, Tibrewal SR, Heaton PA. NICE guideline review: fever in under 5s: assessment and initial management (NG143). Arch Dis Child Educ Pract Ed. – 2022. – Jun;107(3). – 212-216].